



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31131 BALMA CEDEX
Tél. 61. 24. 06. 51

Régisseur de Recettes
D.R.A.F. "MIDI-PYRÉNÉES"
CCP : 8618-62 Y Toulouse
I.S.S.N. : 0752-2053

PUBLICATION PÉRIODIQUE

160 F.
ABONNEMENT ANNUEL :
BULLETIN N° 3 DU 22 FEVRIER 1990

ATTENTION

Avls aux personnes qui n'ont pas encore renouvelé leur abonnement pour 1990 à l'édition "GRANDES CULTURES" : ce bulletin est le dernier qui leur sera envoyé. Ce rappel, adressé à l'ensemble de nos abonnés, ne doit pas être pris en compte si vous avez déjà effectué votre renouvellement d'abonnement.

COLZA

Stades végétatifs

Ils s'étagent de C1 (reprise de végétation) à D1 (boutons accolés cachés par les feuilles terminales).

RAVAGEURS

Situation

Charançon de la tige

Les captures d'adultes en cuvettes jaunes ont commencé dès le début du mois de février. Elles ont été peu importantes en général, à l'exception de quelques postes de piégeage du Gers (MIRAMONT D'ASTARAC, ESCORNEBOEUF). Elles ont été toutefois rapidement stoppées en raison de la période froide suivie de pluies. Actuellement, les sorties d'adultes se poursuivent faiblement.

Meligèthes

Observation d'adultes en cultures dans le Gers (FLEURANCE, MONTAUT, AUCH ...).

Préconisation

Si le temps doux actuel se poursuit, intervenir immédiatement avec un produit efficace pour lutter contre le charançon de la tige.

Choisir parmi l'un des produits ci-après (dose de spécialité commerciale à l'hectare) :

- alphaméthrine	FASTAC	0,15 l
- biphenthrine	TALSTAR	0,07 l
- cyfluthrine	BAYTHROID	0,30 l
- cyperméthrine	nombreuses spécialités	0,25 l
- deltaméthrine	DECIS RU, DECIS FLO, DECIS CE	0,3 l
- lambdacyalothrine	KARATE	0,15 l
- méthidathion	ULTRACIDE 20 bouillie, ULTRACIDE 20 liquide	1,5 l ou kg

CEREALES

Stades végétatifs

Plein tallage à "épi à 1 cm" pour les blés les plus en avance (variété MANITAL par exemple).

MALADIES DU FEUILLAGE

Situation

Elle a peu évolué depuis l'envoi de notre dernier bulletin du 25 Janvier.

Sur les blés précoces, on observe toujours sur les feuilles basses de la rouille brune, peu de septoriose, surtout de l'oïdium (malgré que cette maladie ait nettement régressé depuis un mois).

Sur orge, sont observées surtout de l'helminthosporiose et de l'oïdium, parfois de la rouille naine.

Préconisation

Attendre pour intervenir sur toutes céréales.

Si les conditions climatiques actuelles se poursuivent, une intervention précoce sur orge sera à envisager en mars.

Des conseils de traitements seront indiqués dans nos prochains bulletins.